

Observatoire des captures de Lamproies et de grands Salmonidés

MRM : Qui sommes-nous ?

Association loi 1901, MRM a été créée en 1993 sous l'impulsion du Ministère de l'Environnement et du Conseil Supérieur de la Pêche pour gérer et coordonner le plan Migrateurs. Elle regroupe aujourd'hui 19 fédérations de pêche (Ain, Alpes de Haute Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse, Drôme, Gard, Hérault, Isère, Loire, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Haute-Savoie, Var et Vaucluse), Union Régionale des Fédérations de Pêche de l'Arc Méditerranéen (URFAM), Union Régionale des Fédérations de Pêche de Rhône-Alpes (URFEPA) et l'Association des pêcheurs Rhône-aval-Méditerranée.

Elle a pour but de contribuer à la connaissance, à la restauration et à la gestion des populations de poissons migrants des bassins Rhône-Méditerranée et Corse (RM et C).

Plan Migrateurs Rhône-Méditerranée

Le plan Migrateurs est désormais inclus dans les actions proposées par le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI), qui constitue le cadre général pour la mise en oeuvre des mesures réglementaires, d'études et de travaux concernant les poissons migrants amphihalins¹ sur l'ensemble des bassins RM et C.


Tous les éléments de connaissance sur la biologie des espèces et toutes les études de suivi mises en place grâce au Plan Migrateurs 1993-2003 et au PLAGEPOMI 2004-2009 ont permis d'affiner la stratégie à adopter pour ce troisième PLAGEPOMI 2010-2014.

¹ Vivant alternativement en eau douce et eau de mer

Réseau salmo-lamproies

Sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse, l'aire de répartition et l'état des populations des Lamproies sont très mal connus. Par ailleurs, alors que le bassin méditerranéen n'est pas censé abriter de grands Salmonidés migrants, de grandes truites argentées sont pêchées sur un certain nombre de fleuves dont le Rhône.

Dans le cadre du PLAGEPOMI 2004-2009, un réseau de surveillance des captures de salmonidés et de lamproies a été mis en place sur le bassin en 2005.



Cette mesure doit apporter les éléments nécessaires à la connaissance de l'aire de répartition de ces espèces et à la clarification de leur statut, l'objectif sur le long terme étant de définir une stratégie de gestion et de restauration des populations sur le territoire.



Espèces migratrices

Les Lamproies adultes

- Corps nu anguilliforme dépourvu d'écaillés
- Une ou deux nageoires dorsales
- Yeux bien développés
- Bouche circulaire au centre d'un disque buccal
- 7 orifices branchiaux



Lamproie marine

couleur jaunâtre
marbrée de brun
60 à 80 cm
disque buccal complètement
recouvert de denticules cornés



Lamproie fluviatile

couleur bleuâtre à brun-vert sur le dos
et bronzée sur les flancs
30 à 50 cm
disque buccal partiellement
recouvert de denticules cornés



© Dagmar DAUGY

La Truite de mer

Corps fusiforme dont la robe argentée présente des tâches caractéristiques noires cruciformes sur le flanc au dessus et en dessous de la ligne latérale

Si vous capturez un de ces poissons...

...Contactez au plus vite votre fédération de pêche qui effectuera différents relevés

...Ou contacter MRM - 04.90.93.39.32

Pour la Truite de mer :

- **Bien noter** : la date de capture, le lieu exact, le poids, les longueurs totale et à la fourche
- **Photographie** : du salmonidé, de la tête, du corps et de la queue pris chacun latéralement
- **Prélèvements** : écailles prélevées dans la zone optimale, découpe de la nageoire adipeuse conservée dans l'alcool à 90° non modifié

Pour les Lamproies :

- **Bien noter** : la date de capture, le lieu exact, le poids et la longueur
- **Photographie** : de la lamproie en entier, de la ventouse prise par le dessous (détermination de l'espèce)
- **Prélèvements** : morceau de nageoire à conserver dans l'alcool à 90° non modifié

